



Dr. med. vet. Simone Konopka
 Eckhof 1
 24582 Hoffeld
 Mobil: 0173 - 2462533
 Internet: www.chiro-vet.de
 E-Mail: siko@chiro-vet.de

Frühbeurteilungsschema zur Bewertung des Gesundheitsstatus von neugeborenen Fohlen zwischen 6. und 24. Lebensstunde (Giessener Vorsorgeschema II)

Normale Entwicklung in **den ersten 6 Lebensstunden danach:**

1. Stehvermögen

- | | | |
|--|---|--|
| >> Vollständiges Stehvermögen und koordinierte Bewegung | 3 | |
| >> Stehvermögen unsicher, taumelnde, unkoordinierte Bewegung | 2 | |
| >> Häufige Liegen, schwerfälliges Aufstehen, unkoordinierte Bewegung | 1 | |

2. Körpertemperatur

- | | | |
|-------------------|---|--|
| >> 38,2 - 39,0 °C | 3 | |
| >> > 39,2 °C | 2 | |
| >> < 38,0 °C | 1 | |

3. Mekoniumabgang

- | | | |
|---|---|--|
| >> Normal bis 8 Stunden nach der Geburt, danach Milchkot | 3 | |
| >> Geringe Menge, häufiges Pressen, zunehmende Unruhe | 2 | |
| >> Kein Kotabsatz beobachtet, häufiges Pressen, Unruhe, Liegen und Wälzen | 1 | |

4. Harnabsatz

- | | | |
|---|---|--|
| >> Normal im Strahl mehrfach nach der Geburt in genügender Menge | 3 | |
| >> Häufiger Harndrang mit Absatz kleiner Portionen oder in Tropfen | 2 | |
| >> Kein Harnabsatz, trotz häufiger Harnabsatzposition (weibl./männl.) | 1 | |

5. Atmung

- | | | |
|---|---|--|
| >> Regelmäßig und gleichmäßig | 3 | |
| >> Unregelmäßig | 2 | |
| >> Stossweise - flach, geblähte Nüstern | 1 | |

Kontakt mit Muttertier

- | | | |
|---|---|--|
| >> Regelmäßiger Kontakt mit Aufsuchen des Euters und Sauggeräuschen | 3 | |
| >> Abstand zur Mutter erheblich, kaum oder abnehmender Euterkontakt | 2 | |
| >> Umherirren ohne Mutterkontakt, kein Aufsuchen des Euters | 1 | |

Gesamt

Punktzahl:	18	Punkte	vitales Fohlen
	17-15	Punkte	gefährdetes Fohlen
	<15	Punkte	hochgeradig gefährdetes Fohlen